

# TEST DE CONNAISSANCES DESTINÉ AUX PATIENTES :

COMPRENDRE L'IMPORTANCE DE  
PRÉVENIR UNE GROSSESSE



TARO-Acitretin

PROGRAMME DE PRÉVENTION DE LA GROSSESSE





# TARO-Acitretn

Ce test a été développé afin d'évaluer votre compréhension des risques associés à la prise de capsules de Taro-Acitretn (acitrétine) et sur les façons de les minimiser. Afin de réaliser ce test, assurez-vous d'avoir entièrement lu le « Guide général d'administration du médicament destiné aux patients » et le « Guide sur la Prévention de la grossesse et les précautions à prendre destiné aux patientes » et d'avoir discuté des risques liés au Taro-Acitretn (acitrétine) avec votre médecin. Si vous répondez correctement à toutes les questions, vous aurez alors le sentiment d'être mieux préparée à signer le « Formulaire de consentement éclairé destiné aux patients ».

**Veillez entourer la meilleure réponse pour chacune des questions suivantes :**

- 1. Parmi les propositions suivantes, laquelle peut être la conséquence de la prise de Taro-Acitretn (acitrétine) pendant une grossesse?**
  - a. Le médicament ne sera pas efficace
  - b. Le médicament est susceptible de stimuler la croissance des cheveux
  - c. Le médicament peut provoquer de graves anomalies congénitales
  - d. Le médicament est susceptible de réduire les taux de cholestérol
- 2. Vous ne devez pas tomber enceinte pendant un traitement au Taro-Acitretn (acitrétine). Parmi les propositions suivantes, quelle est la meilleure façon d'y parvenir?**
  - a. Utiliser n'importe quelle sorte de pilule contraceptive en la prenant au moins un mois avant de commencer le traitement au Taro-Acitretn (acitrétine).
  - b. Réaliser deux tests de grossesse dans un laboratoire agréé. Les deux tests doivent être négatifs, le dernier test devant être réalisé par plus de trois jours avant le début du traitement au Taro-Acitretn (acitrétine).
  - c. Ne pas avoir de rapport sexuel avec votre partenaire pendant le mois précédant le début du traitement au Taro-Acitretn (acitrétine).
  - d. Vous assurer que votre partenaire porte un préservatif toutes les fois où vous avez un rapport sexuel pendant le mois précédant le début du traitement au Taro-Acitretn (acitrétine).
- 3. Quand devriez-vous commencer à prendre deux formes de contraception efficaces en cas de traitement au Taro-Acitretn (acitrétine)?**
  - a. Au moins un mois avant de commencer à prendre du Taro-Acitretn (acitrétine)
  - b. Le mois où je commence à prendre du Taro-Acitretn (acitrétine)
  - c. Le premier mois où j'ai des rapports sexuels après l'arrêt de mon traitement au Taro-Acitretn (acitrétine)
  - d. Durant les premiers jours du cycle menstruel, le mois après avoir commencé à prendre du Taro-Acitretn (acitrétine)
- 4. Pendant combien de temps est-ce que les deux formes de contraception efficaces doivent être prises pendant un traitement au Taro-Acitretn (acitrétine)?**
  - a. Jusqu'à la fin du traitement au Taro-Acitretn (acitrétine)
  - b. Jusqu'à la fin du traitement au Taro-Acitretn (acitrétine), mais alors, une forme de contraception doit être prise pendant encore deux ans
  - c. Pendant un an après la dernière dose de Taro-Acitretn (acitrétine)
  - d. Pendant au moins trois ans après la dernière dose de Taro-Acitretn (acitrétine)



# TARO-Acitretin

**5. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est PAS un choix pertinent pour l'une des deux formes efficaces de contraception à utiliser avec la prise de Taro-Acitretin (acitrétine)?**

- a. Des pilules progestatives à faible dose (mini-pilules)
- b. Timbre contraceptif
- c. Dispositif intra-utérin
- d. Ligature des trompes

**6. Laquelle/lesquelles des précautions à prendre en cas de traitement au Taro-Acitretin (acitrétine) est/sont VRAIE(S)?**

- a. Boire de l'alcool en même temps que la prise de Taro-Acitretin (acitrétine) peut transformer le médicament en un autre produit chimique nocif qui reste dans l'organisme pendant longtemps.
- b. Le Taro-Acitretin (acitrétine) peut augmenter la sensibilité de la peau en cas d'exposition excessive aux rayons du soleil
- c. Toutes les personnes prenant du Taro-Acitretin (acitrétine) ne doivent pas donner leur sang pendant au moins trois ans après la dernière prise du médicament.
- d. Toutes les réponses ci-dessus sont VRAIES.

**7. Vrai ou Faux?    Vrai    Faux** (entourer la bonne réponse)

Il peut vous être demandé de réaliser des analyses sanguines pendant votre traitement au Taro-Acitretin (acitrétine) afin de déterminer si la dose que vous recevez est la plus adaptée pour vous.

**8. Vrai ou Faux?    Vrai    Faux** (entourer la bonne réponse)

Vous pouvez arrêter de faire des tests de grossesse dès la fin de votre traitement au Taro-Acitretin (acitrétine), sauf si vous pensez avoir eu des rapports sexuels non protégés.



# TARO-Acitrein

## RÉPONSES

### 1. La réponse c est correcte.

Le Taro-Acitrein (acitrétine) peut provoquer des anomalies congénitales si une femme prend le médicament pendant quatre semaines avant ou pendant la grossesse ou si elle tombe enceinte dans les trois ans suivant la fin du traitement. La réponse b est incorrecte car le médicament peut provoquer la perte de cheveux (et non pas une croissance) et la réponse d est incorrecte car le médicament peut augmenter les taux de cholestérol (et non pas les faire baisser).

### 2. La réponse b est correcte.

La meilleure façon de vous assurer que vous n'êtes pas enceinte est de réaliser deux tests de grossesse dans un laboratoire agréé. Les deux tests doivent être négatifs, le dernier test devant être réalisé pas plus de trois jours avant le début du traitement au Taro-Acitrein (acitrétine).

### 3. La réponse a est correcte.

Vous devez commencer à prendre deux formes efficaces de contraception au moins un mois avant le début du traitement au Taro-Acitrein (acitrétine). Comme indiqué à la question 2, vous devez également avoir réalisé deux tests de grossesse (avec un résultat négatif) avant le début du traitement au Taro-Acitrein (acitrétine).

### 4. La réponse d est correcte.

Du fait que le Taro-Acitrein (acitrétine) peut rester dans l'organisme aussi longtemps, deux formes de contraception efficaces doivent être utilisées pendant au moins trois ans après la prise de la dernière dose du médicament.

### 5. La réponse a est correcte.

Les pilules progestatives à faible dose (mini-pilules) ne constituent pas une méthode fiable de contraception à utiliser pendant un traitement au Taro-Acitrein (acitrétine). Les trois autres choix (p. ex. réponses b, c et d) sont toutes des options principales adaptées pour une contraception efficace.

### 6. La réponse d est correcte.

Toutes les réponses a, b et c sont correctes. Toute personne prenant du Taro-Acitrein (acitrétine) ne doit pas boire d'alcool, doit se protéger en cas d'exposition aux rayons du soleil et ne doit pas donner son sang après la prise de la dernière dose de Taro-Acitrein (acitrétine).

### 7. Réponse correcte.

Des tests sanguins peuvent être demandés lorsque vous prenez du Taro-Acitrein (acitrétine) pour s'assurer que la posologie vous convient. Il est très important de vous rendre régulièrement chez votre médecin (tous les mois par exemple) et de ne pas annuler vos rendez-vous.

### 8. La réponse est « Faux ».

Vous devez continuer à réaliser des tests de grossesse régulièrement tous les 28 jours jusqu'à la prise de la dernière dose de Taro-Acitrein (acitrétine), puis tous les un à trois mois pendant au moins trois ans après la prise de la dernière dose de Taro-Acitrein (acitrétine).

# TARO-Acitretin

## **COMMENT S'EST PASSÉ LE TEST?**

Si vous avez correctement répondu aux huit questions, toutes nos félicitations! Si vous avez mal répondu à n'importe laquelle des questions, veuillez relire le « Guide général d'administration du médicament destiné aux patients » et le « Guide sur la Prévention de la grossesse et les précautions à prendre destiné aux patientes » afin de vous assurer de bien comprendre toutes les informations qu'ils contiennent. Pour toute question ou préoccupation, assurez-vous d'en parler avec votre médecin avant de commencer un traitement au Taro-Acitretin (acitrétine). Si vous n'êtes pas en mesure de satisfaire à toutes les exigences du Programme de prévention de la grossesse, veuillez discuter avec votre médecin de traitements alternatifs.